

Rinite alérgica na atualidade

A prevalência das doenças alérgicas tem aumentado na última década. O International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) valendo-se de instrumento único e padronizado (questionário escrito, QE) permitiu obter-se, pela primeira vez no mundo nos últimos anos, dados epidemiológicos sobre a prevalência das mesmas. Após a sua validação para a nossa cultura, o QE foi aplicado em várias localidades do país e de maneira inédita, nos foi possível conhecer a real prevalência dessas doenças em população de escolares. No município de São Paulo, durante o ano de 1997, a prevalência de rino-conjuntivite alérgica foi de 13,0% e 14,4% entre escolares de seis e sete anos de idade e de adolescentes de 13 a 14 anos, respectivamente. Esses dados demonstram a

real dimensão da rinite alérgica em nosso meio. Nesse número da revista da SBAI publicamos o estudo de Fomin et al onde são apresentados os resultados de nasofibroscopia flexível em pacientes com rinite alérgica não responsiva a tratamento habitual. Por ser de fácil e rápida realização permite identificar comorbidades e instituir terapêuticas mais adequadas. Todavia, o custo elevado do equipamento, a necessidade de treino específico do profissional que o maneja, bem como a necessidade de colaboração dos pacientes têm limitado a sua utilização na prática diária. É exame complementar muito útil na avaliação dos pacientes com obstrução nasal refratária aos tratamentos habituais

Os Editores

[\[Home Page SBAI\]](#) [\[Índice Geral\]](#) [\[Índice do Fascículo\]](#)

A Revista Brasileira de Alergia e Imunopatologia é publicação oficial da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia.
Copyright 1998 SBAI - Av. Prof. Ascendino Reis, 455 - São Paulo - SP - Brasil - CEP: 04027-000